

Rok szkolny 2023/24

Wymagania stanu Nowy Jork dotyczące szczepień ochronnych dla osób przyjętych do szkoły / uczestniczących w zajęciach¹

UWAGI:
Wszystkie dzieci uczęszczające do szkół w stanie Nowy Jork muszą być zaszczepione odpowiednio do wieku. Liczba dawek zależy od schematu zalecanego przez Komitet Doradczy ds. Praktyk Immunizacyjnych (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP). Odstępy pomiędzy dawkami szczepionki muszą być zgodne ze [Schematem szczepień dla dzieci i młodzieży zalecanym przez ACIP](#). Dawki otrzymane przed osiągnięciem minimalnego wieku lub odstępów czasu nie są ważne i nie wliczają się do liczby dawek wymienionych poniżej. Szczegółowe informacje na temat każdej szczepionki znajdują się w przypisach. Dzieci zapisywane na zajęcia bez podziału na klasy muszą spełniać wymagania dotyczące szczepień dla klas, do których są równoważne wiekowo.

Wymagania dotyczące dawkowania NALEŻY odczytywać wraz z przypisami do tego harmonogramu.

Szczepienia	Przedszkole (Opieka Dzienna, Head Start, żłobek lub Pre-k)	Przedszkole i klasy 1, 2, 3, 4 i 5	Klasy 6, 7, 8, 9, 10 i 11	Klasa 12
Szczepionka zawierająca toksoid błonicy i tężcowy oraz szczepionka przeciwko krztuścowi (DTaP/DTP/Tdap/Td) ²	4 dawki	5 dawek lub 4 dawki jeśli czwartą dawkę przyjęto w wieku 4 lat lub starszym lub 3 dawki w wieku 7 lat lub starszym, a serię rozpoczęto w wieku 1 roku lub starszym 3 dawki w wieku 7 lat lub starszym, jeśli serię rozpoczęto w wieku 1 roku lub starszym		3 dawki
Szczepionka zawierająca toksoid tężcowy i błonicy oraz dawka przypominająca szczepionki przeciwko krztuścowi dla młodzieży (Tdap) ³		Nie dotyczy		1 dawka
Szczepionka przeciwko polio (IPV/OPV) ⁴	3 dawki	4 dawki lub 3 dawki , jeśli trzecią dawkę przyjęto w wieku 4 lat lub starszym		
Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) ⁵	1 dawka	2 dawki		
Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ⁶	3 dawki	3 dawki lub 2 dawki szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla dorosłych (Recombivax) dla dzieci, które otrzymały dawki w odstępie co najmniej 4 miesięcy w wieku od 11 do 15 lat		
Szczepionka przeciwko ospie wietrznej (Varicella) ⁷	1 dawka	2 dawki		
Skoniugowana szczepionka przeciwko meningokokom (MenACWY) ⁸		Nie dotyczy	Klasy 7, 8, 9, 10 i 11: 1 dawka	2 dawki lub 1 dawka , jeśli dawkę przyjęto w wieku 16 lat lub starszym
Szczepionka skoniugowana przeciwko Haemophilus influenzae typu b (Hib) ⁹	od 1 do 4 dawek	Nie dotyczy		
Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom (PCV) ¹⁰	od 1 do 4 dawek	Nie dotyczy		



1. Wykazane serologiczne dowody na obecność przeciwciał przeciwko odrze, śwince lub różyczce lub laboratoryjne potwierdzenie tych chorób są akceptowalnym dowodem odporności na te choroby. Testy serologiczne w kierunku polio są akceptowalnym dowodem odporności tylko wtedy, gdy test został wykonany przed 1 września 2019 roku i wszystkie trzy serotypy były pozytywne. Dodatni wynik badania krwi na obecność przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B jest akceptowalnym dowodem odporności na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Udowodnione serologiczne dowody na obecność przeciwciał przeciwko ospie wietrznej, potwierdzenie laboratoryjne ospy wietrznej lub diagnoza lekarza, asystenta lekarza lub pielęgniarki, że dziecko przebyło ospę wietrzną, jest dopuszczalnym dowodem odporności na ospę wietrzną.
2. Szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi oraz acelularna szczepionka przeciw krztuścowi (DTaP). (Minimalny wiek: 6 tygodni)
 - a. Dzieci przystępujące do serii terminowo powinny otrzymać 5-dawkową serię szczepionki DTaP w wieku 2 miesięcy, 4 miesięcy, 6 miesięcy oraz w wieku od 15 do 18 miesięcy, a także w wieku 4 lat lub starszym. Czwartą dawkę można otrzymać już w wieku 12 miesięcy, pod warunkiem, że od trzeciej dawki upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Jednak czwartej dawki DTaP nie trzeba powtarzać, jeśli podano ją co najmniej 4 miesiące po trzeciej dawce DTaP. Ostatnią dawkę z serii trzeba podać z chwilą ukończenia czwartego roku życia i co najmniej 6 miesięcy po podaniu poprzedniej dawki.
 - b. Jeżeli czwartą dawkę DTaP podano w wieku 4 lat lub starszym i co najmniej 6 miesięcy po 3. dawce, piąta (przypominająca) dawka szczepionki DTaP nie jest wymagana.
 - c. Dzieci w wieku 7 lat i starsze, które nie są w pełni zaszczepione serią szczepionek dziecięcych DTaP, powinny otrzymać szczepionkę Tdap jako pierwszą dawkę w serii wyrównawczej; jeśli potrzebne są dodatkowe dawki, należy zastosować szczepionkę Td lub Tdap. Jeśli pierwszą dawkę podano przed pierwszymi urodzinami dziecka, wymagane są 4 dawki, o ile ostatnia dawka została podana w wieku 4 lat lub starszym. Jeśli pierwsza dawka została podana w dniu pierwszych urodzin lub później, wymagane są 3 dawki, o ile ostatnia dawka została podana w wieku 4 lat lub starszym.
3. Szczepionka przypominająca przeciwko tężcowi i błonicy oraz bezkomórkowa szczepionka przypominająca przeciwko krztuścowi (Tdap). (Minimalny wiek dla klas 6–9: 10 lat; minimalny wiek dla klas 10–12: 7 lat)
 - a. Uczniowie w wieku 11 lat lub starsi rozpoczynający naukę w klasach od 6 do 12 muszą otrzymać jedną dawkę Tdap.
 - b. Oprócz wymagań dla klas od 6 do 12 serię Tdap można również podawać jako część serii wyrównawczej u uczniów w wieku 7 lat i starszym, którzy nie są w pełni zaszczepieni serią DTaP dla dzieci, jak opisano powyżej. W roku szkolnym 2023/24 tylko dawki Tdap podane w wieku 10 lat lub starszym spełnią wymóg serii Tdap dla uczniów klas 6–9; jednak dawki serii Tdap podawane w wieku 7 lat lub starszym spełnią wymagania dla uczniów klas 10–12.
 - c. Uczniowie, którzy ukończyli 10 lat w klasie 6 i nie otrzymali jeszcze szczepionki serii Tdap, spełniają wymaganie do ukończenia 11. roku życia.
4. Inaktywowana szczepionka przeciw polio (IPV) lub doustna szczepionka przeciw polio (OPV). (Minimalny wiek: 6 tygodni)
 - a. Dzieci przystępujące do serii terminowo powinny otrzymać serię szczepionki IPV w wieku 2 miesięcy, 4 miesięcy oraz w wieku od 6 do 18 miesięcy, a także w wieku 4 lat lub starszym. Ostatnią dawkę z serii trzeba podać z chwilą ukończenia czwartego roku życia i co najmniej 6 miesięcy po podaniu poprzedniej dawki.
 - b. Uczniom, którzy otrzymali czwartą dawkę przed 4. rokiem życia i przed 7 sierpnia 2010 roku, wystarczą 4 dawki w odstępie co najmniej 4 tygodni.
 - c. Jeżeli trzecia dawka szczepionki przeciwko polio została podana w wieku 4 lat lub starszym i co najmniej 6 miesięcy po poprzedniej dawce, czwarta dawka szczepionki przeciwko polio nie jest wymagana.
 - d. W przypadku dzieci z historią OPV tylko trójwartentne OPV (tOPV) liczy się do wymagań stanu Nowy Jork dotyczących szkolnych szczepień przeciwko polio. Dawki OPV podane przed 1 kwietnia 2016 roku powinno się wliczać, chyba że wyraźnie zaznaczono, że są to dawki monowalentne, dwuwalentne lub podane podczas kampanii uodporniania przeciwko poliowirusowi. Nie wolno wliczać dawek OPV podanych w dniu 1 kwietnia 2016 roku lub później.
5. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR). (Minimalny wiek: 12 miesięcy)
 - a. Pierwsza dawka szczepionki przeciwko MMR musi zostać podana z chwilą ukończenia pierwszego roku. Druga dawka musi zostać podana co najmniej 28 dni (4 tygodnie) po pierwszej dawce, aby została uznana za ważną.
 - b. Odra: Jedna dawka jest wymagana dla dziecka w wieku przedszkolnym. W klasach od zerówki do 12 wymagane są dwie dawki.
 - c. Świnka: Jedna dawka jest wymagana dla dziecka w wieku przedszkolnym. W klasach od zerówki do 12 wymagane są dwie dawki.
 - d. Różyczka: Dla wszystkich klas (od przedszkola do 12) wymagana jest co najmniej jedna dawka.
6. Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 - a. Dawkę 1 można podać po urodzeniu lub w dowolnym późniejszym czasie. Dawkę 2 należy podać co najmniej 4 tygodnie (28 dni) po dawce 1. Dawka 3 musi nastąpić co najmniej 8 tygodni po dawce 2 ORAZ co najmniej 16 tygodni po dawce 1 ORAZ nie wcześniej niż w wieku 24 tygodni (w przypadku podawania 4 dawek należy w tych obliczeniach zastąpić „dawkę 4” „dawką 3”).
 - b. Dwie dawki szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla dorosłych (Recombivax), otrzymane w odstępie co najmniej 4 miesięcy w wieku od 11 do 15 lat, spełnią wymóg.
7. Szczepionka przeciwko ospie wietrznej (Varicella). (Minimalny wiek: 12 miesięcy)
 - a. Pierwsza dawka szczepionki przeciwko ospie wietrznej musi zostać podana z chwilą ukończenia pierwszego roku. Druga dawka musi zostać podana co najmniej 28 dni (4 tygodnie) po pierwszej dawce, aby została uznana za ważną.
 - b. Dla dzieci w wieku poniżej 13 lat zalecana minimalna przerwa między dawkami wynosi 3 miesiące (jeśli druga dawka została podana co najmniej 4 tygodnie po pierwszej dawce, może być uznana za ważną); dla osób w wieku 13 lat i starszych minimalna przerwa między dawkami wynosi 4 tygodnie.
8. Skonfigurowana szczepionka ACWY przeciwko meningokokom (MenACWY). (Minimalny wiek dla klas 7–10: 10 lat; minimalny wiek dla klas 11 i 12: 6 tygodni)
 - a. Jedna dawka skoniugowanej szczepionki przeciw meningokokom (Menactra, Menveo lub MenQuadfi) jest wymagana dla uczniów rozpoczynających klasę 7, 8, 9, 10 i 11.
 - b. W przypadku uczniów w klasie 12., jeśli pierwsza dawka skoniugowanej szczepionki przeciw meningokokom została podana w wieku 16 lat lub starszym, druga dawka (przypominająca) nie jest wymagana.
 - c. Druga dawka musi być podana w wieku 16 lat lub starszym. Minimalny odstępek między dawkami wynosi 8 tygodni.
9. Szczepionka skoniugowana przeciwko Haemophilus influenzae typu b (Hib). (Minimalny wiek: 6 tygodni)
 - a. Dzieci przystępujące do serii terminowo powinny otrzymać szczepionkę przeciwko Hib w wieku 2 miesięcy, 4 miesięcy, 6 miesięcy oraz w wieku od 12 do 15 miesięcy. Dzieci w wieku powyżej 15 miesięcy muszą otrzymać serię wyrównawczą j zgodnie z harmonogramem ACIP dotyczącym podawania serii wyrównawczej. Ostatnia dawka musi być podana w ciągu 12 miesięcy lub później.
 - b. Jeśli 2 dawki szczepionki zostały podane przed ukończeniem 12. miesiąca życia, wymagane są tylko 3 dawki z dawką 3 podaną w wieku od 12 do 15 miesięcy i co najmniej 8 tygodni po dawce 2.
 - c. Jeśli dawkę 1 podano w wieku od 12 do 14 miesięcy, wymagane są tylko 2 dawki, a dawka 2 co najmniej 8 tygodni po dawce 1.
 - d. Jeśli dawka 1 została podana w wieku 15 miesięcy lub starszym, wymagana jest tylko 1 dawka.
 - e. Szczepionka Hib nie jest wymagana dla dzieci w wieku 5 lat lub starszych.
 - f. [Więcej informacji zawierają Wskazówki CDC dotyczące uzupełniania zaległych szczepień u dzieci zdrowych w wieku od 4 miesięcy do 4 lat.](#)
10. Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom (PCV). (Minimalny wiek: 6 tygodni)
 - a. Dzieci przystępujące do serii terminowo powinny otrzymać szczepionkę przeciwko PCV w wieku 2 miesięcy, 4 miesięcy, 6 miesięcy oraz w wieku od 12 do 15 miesięcy. Dzieci w wieku powyżej 15 miesięcy muszą otrzymać serię wyrównawczą j zgodnie z harmonogramem ACIP dotyczącym podawania serii wyrównawczej. Ostatnia dawka musi być podana w ciągu 12 miesięcy lub później.
 - b. Niezaszczepione dzieci w wieku od 7 do 11 miesięcy muszą otrzymać 2 dawki w odstępie co najmniej 4 tygodni, a następnie trzecią dawkę w wieku od 12 do 15 miesięcy.
 - c. Niezaszczepione dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy muszą otrzymać 2 dawki szczepionki w odstępie co najmniej 8 tygodni.
 - d. Jeżeli jedna dawka szczepionki została podana w wieku 24 miesięcy lub starszym, dalsze dawki nie są wymagane.
 - e. PCV nie jest wymagane u dzieci w wieku 5 lat lub starszych.
 - f. [Więcej informacji zawierają Wskazówki CDC dotyczące uzupełniania zaległych szczepień u dzieci zdrowych w wieku od 4 miesięcy do 4 lat.](#)

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

**New York State Department of Health
Bureau of Immunization
Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY 12237
(518) 473-4437**

**New York City Department of Health and Mental Hygiene
Program Support Unit, Bureau of Immunization,
42-09 28th Street, 5th floor
Long Island City, NY 11101
(347) 396-2433**

New York State Department of Health/Bureau of Immunization
health.ny.gov/immunization