

その他の情報や 支援が用意されて います。

ニューヨーク州保健局 (New York State
Department of Health)

health.ny.gov/diseases/aids/publications

ニューヨーク州HIV/エイズホットライン (フリー
ダイヤル)

英語: 1-800-541-AIDS

スペイン語: 1-800-233-SIDA

聴覚障害者用通信機器 (TDD) :
1-800-369-2437

音声通話利用者はニューヨークリレーシ
ステム (New York Relay System) の
711か1-800-421-1220にダイヤルし、
オペレーターに1-800-541-2437に
つなげるよう伝えてください

NYSDOH HIV匿名相談および検査プログラム
(New York State Department of Health,
Anonymous HIV Counseling and Testing Program)

HIVに関する情報、紹介、無料・無記名でのHIV検
査の受け方についての情報は、HIV匿名相談および
検査プログラムまでお問い合わせください。

Albany地域: 1-800-962-5065

Buffalo地域: 1-800-962-5064

Long Island地域 (Suffolk/Nassau) :
1-800-462-6786

Lower Hudson Valley地域 :
1-800-828-0064

その他の情報や 支援が用意されて います。

Rochester地域: 1-800-962-5063、TDD :
1-585-423-8120

Syracuse地域: 1-800-562-9423

ニューヨーク市: DOHMHの性感染症
クリニックに関する情報については311に
お電話ください

ニューヨーク市HIV/エイズホットライン
1-800-TALK-HIV (825-5448)

アメリカ疾病管理予防センター (Centers for
Disease Control and Prevention)
STD (性感染症) ホットライン
英語/スペイン語 1-800-232-4636、
1-888-232-6348

ニューヨーク州HIV/エイズ相談ホットライン
1-800-872-2777

ニューヨーク州パートナーサービス
(Partner Services) :
1-800-541-AIDS

ニューヨーク市接触通知支援プログラム
(Contact Notification Assistance Program) :
1-212-693-1419

秘密厳守

ニューヨーク州秘密厳守ホットライン :
1-800-962-5065

法律相談センター (Legal Action Center) :
1-212-243-1313または 1-800-223-4044



Department
of Health

検査があ ります

この医療施設は、適正な医療と
公衆衛生法に従って、13歳以上
のすべての患者にHIV検査を受け
ることを勧めています。

一般的な臨床検査

- ✓ 血糖
- ✓ コレステロール
- ✓ HIV検査
- ✓ 全血球計算
- ✓ 脂質プロファイル

HIVで最悪な状態とは、感染の有無
を知らないままです。
検査を受ければコントロールする
力を得られます。

<https://campaigns.health.ny.gov/BeyondStatus>

HIV検査を受ける前に知っておくべき重要な事項

- HIV検査は任意であり、その結果はすべて機密（開示されない）として扱われます。
- HIVは、無防備なセックス、注射針の共有、出産、授乳などを通じて感染する可能性があります。
- HIVの治療は効果的で、副作用はほとんどまたはまったくなく、1日1錠を服用するだけで済むこともあります。
- パートナーがいる人は、互いのHIV感染の有無を知り、HIV治療や曝露前予防薬（pre-exposure prophylaxis, PrEP）によって、お互いの安全を守ることができます。注射針を共有せず、より安全なセックスを実践することが、HIV、C型肝炎、その他の性感染症の予防に役立ちます。
- HIV感染の有無を理由に人を差別することは違法です。
- 特定の公的検査施設では、匿名で（名前を明かすことなく）HIV検査を受けられます。
- HIV検査は日常的な医療の一環ですが、あなたにはHIV検査に異議を唱える、またはそれを拒否する権利があります。
- HIV検査を拒否したい場合は、医療提供者に知らせてください。

HIV検査は妊娠中の女性にとって特に大切です。

- 感染している母親は、妊娠中、出産時、あるいは授乳を通して子供にHIVを移す可能性があります。
- HIVに感染しているかどうかを、妊娠以前に、あるいは妊娠初期に知ることによって、女性は自分と赤ちゃんの健康について重要な決定ができます。
- HIV検査は妊娠期のできるだけ早い時期に実施され、患者の同意を得て妊娠末期（第三期）に再度実施されます。
- HIVに感染している妊婦は、自身の健康と赤ちゃんへのHIV感染を予防するための治療が受けられます。
- HIVに感染していて治療を受けない場合は、4人に1人の割合で赤ちゃんにHIVを移す可能性があります。治療を受ければ赤ちゃんにHIVを移す可能性は大変低くなります。
- 妊娠中に検査を受けていない場合、医療提供者は分娩中に検査を受けることを勧めます。どのような場合でも赤ちゃんは出生後に検査されます。赤ちゃんの結果が陽性だった場合には、あなたがHIV感染しており、赤ちゃんがHIVウィルスにさらされていたことを意味します。

HIVの検査結果をいつどのよう
に得られるかについては、
担当の医療提供者に相談して
ください。

HIV感染者がHIV治療を受けており、6か月以上ウィルスが検出できない場合、性行為を通じてパートナーにHIVを感染させる実質上のリスクはありません。これは、「検出限界値未満（Undetectable）＝感染不可能（Untransmittable）」、または「U = U」と呼ばれます。

州法により、HIV検査結果の機密性（プライバシー）が保護されています。また、HIV感染を理由とする差別からも保護されます。