


# Cascada de Tratamiento del VIH en el Estado de Nueva York, 2022

## Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.2% estimación del Estado de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Ciudad de Nueva York, 2022

Residentes de la Ciudad de Nueva York† a Fines del 2022




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (5.6% estimación de la ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York, 2022

Residentes del Estado de Nueva York, Sin Incluir la Ciudad de Nueva York†, a Fines del 2022



**94% de los casos con cualquier cuidado del VIH**

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Albany del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Albany del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2022




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Binghamton del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Binghamton del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2022




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se la haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Buffalo del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Buffalo del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2022



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Lower Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Lower Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2022

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

Personas estimadas que viven con el VIH (PQVCV) †

3,930

Personas que viven con VIH diagnosticado (PQVCVD)

3,610 92% de las PQVCV

Cuidado del VIH durante el año\*

3,190 81% de las PQVCV  
88% de las PQVCVD

Casos con supresión viral (n.d. o <200 copias/ml) en el análisis más cercano al final del año

3,000 76% de las PQVCV  
82% de las PQVCVD  
94% de los casos con cualquier cuidado del VIH


† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Mid Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Mid Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2022



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2022




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Rochester del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Rochester del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2022




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Syracuse del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Syracuse del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2022



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre<sup>§</sup>

Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022

0 20,000 40,000 60,000



<sup>§</sup> Incluye casos con riesgo de transmisión del VIH por HSH (hombres que tienen sexo con otros hombres) y HSH/UDI (usuarios de drogas inyectables).

<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Uso de Drogas Inyectables<sup>§</sup>

Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022

0 5,000 10,000 15,000 20,000



<sup>§</sup> Incluye casos con riesgos de transmisión del VIH por UDI y HSH/UDI.


<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.0% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Contacto Heterosexual

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022



78% de las PQVCV  
88% de las PQVCVD

70% de las PQVCV  
79% de las PQVCVD  
91% de los casos con cualquier cuidado del VIH


† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (11.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como de color y/o afroamericanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (12.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como hispanas

## Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (15.1% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como blancas

## Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como multirraza

## Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.4% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como nativas americanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (19.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)


\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como asiáticas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (11.3% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como nativos hawaianos / isleños del Pacífico

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (19.3% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres<sup>§</sup>

Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022



<sup>§</sup> Sexo asignado al nacer


<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.5% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Cisgenero<sup>§</sup>

Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022



<sup>§</sup> Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer

<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.5% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)


\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department  
of Health

# Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres<sup>§</sup>

Residentes del estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022



<sup>§</sup> Sexo asignado al nacer

<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (9.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Cisgenero<sup>§</sup>

Residentes del estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022



<sup>§</sup> Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer


<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (9.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Las personas transgénero y las personas de género no conforme o género no binario<sup>§</sup>

Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022



cualquier cuidado del VIH

<sup>§</sup> Incluye Hombre transgénero, Mujer transgénero y personas de género no conforme o género no binario


<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.2% estimación del Estado de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Jóvenes (personas entre 13 a 24 años de edad)

## Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (43.6% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Adultos Mayores de 50 años

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2022



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (4.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para personas mayores de 55 años de edad)


\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

# Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Pertencientes a Minorías<sup>§</sup>

Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022



<sup>§</sup> Incluye a hombres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.5% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para varones)


\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department  
of Health

# Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Pertenecientes a Minorías<sup>§</sup>

Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022



<sup>§</sup> Incluye a mujeres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancas no hispanas.

<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (9.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para mujeres)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health

# Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre Entre Personas de Color<sup>§</sup> Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2022



<sup>§</sup> Incluye a HSH y HSH/UDI de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para HSH y HSH/UDI)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Department of Health