

Per saperne di più

- In caso di dubbi, rivolgiti al tuo medico od operatore sanitario.
- Contatta il dipartimento della salute statale o locale.
- Visita il sito del New York State Department of Health (NYSDOH): coronavirus.health.ny.gov/pregnancy-covid-19
- Visita il sito dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC): cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
- Visita il sito del servizio MotherToBaby: mothertobaby.org/pregnancy-breastfeeding-exposures/covid-19/



**Proteggi te stessa,
la tua famiglia e
il tuo bambino:
vaccinati contro
il COVID-19!**



[coronavirus.health.ny.gov/
pregnancy-covid-19](https://coronavirus.health.ny.gov/pregnancy-covid-19)



**Proteggi te stessa,
la tua famiglia e il
tuo bambino:
vaccinati
contro il
COVID-19!**



Chi dovrebbe vaccinarsi?

Le ricerche dimostrano che il vaccino anti COVID-19 è sicuro prima, durante e dopo la gravidanza. Se hai intenzione di avere un figlio, stai provando a rimanere incinta, sei già incinta o stai allattando al seno, vaccinati subito! È una raccomandazione del New York State Department of Health, dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, dell'American College of Obstetricians and Gynecologists e della Society for Maternal-Fetal Medicine.



Perché devo vaccinarmi?

- Se sei incinta, hai un rischio maggiore di contrarre la malattia in forma grave, di sviluppare complicanze durante la gravidanza e di decesso a causa del COVID-19 rispetto a chi non è in stato di gravidanza.
- I vaccini anti COVID-19 non provocano alcuna infezione, nemmeno nelle donne incinte o nei neonati.
- Le donne incinte che si vaccinano contro il COVID-19 non presentano un rischio superiore di perdita del feto (aborto spontaneo) né di altri problemi durante la gravidanza.
- I vaccini anti COVID-19 non influenzano la probabilità di restare incinta, nemmeno nelle donne che si sottopongono a terapie per la fertilità.
- Gli studi non hanno rilevato alcun legame tra i vaccini anti COVID-19 e problematiche relative a gravidanza, ciclo mestruale, erezione, qualità spermatica o infertilità.

Cos'altro devo sapere?

- Non è necessario effettuare un test di gravidanza prima di vaccinarsi contro il COVID-19.
- Una volta vaccinata, potrai continuare ad allattare al seno. Il neonato non risentirà in alcun modo del vaccino. Vaccinandoti, puoi ridurre le probabilità che il tuo bambino contragga il COVID-19. Già nel grembo materno, e successivamente con il latte materno, vengono trasmessi al bambino anticorpi protettivi.
- Le donne incinte possono vaccinarsi contro il COVID-19 ovunque sia disponibile.

