

Где можно получить дополнительную информацию?

- Если у вас есть какие-либо вопросы, обсудите их со своим поставщиком медицинских услуг.
- Позвоните в местный департамент здравоохранения или в департамент здравоохранения штата.
- Перейдите на веб-сайт Управления здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, NYSDOH) по адресу coronavirus.health.ny.gov/pregnancy-covid-19
- Посетите веб-сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) по адресу cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
- Ознакомьтесь с информацией на веб-сайте MotherToBaby по адресу mothertobaby.org/pregnancy-breastfeeding-exposures/covid-19/



Защитите себя, свою семью и своего ребенка: вакцинируйтесь от COVID-19!



[coronavirus.health.ny.gov/
pregnancy-covid-19](https://coronavirus.health.ny.gov/pregnancy-covid-19)



Защитите себя, свою семью и своего ребенка: вакцинируйтесь от COVID-19!



Кому рекомендуется пройти вакцинацию?

Исследования показывают, что проходить вакцинацию от COVID-19 безопасно до, во время и после беременности. Если вы планируете беременность, пытаетесь забеременеть, беременны или кормите грудью, пройдите вакцинацию прямо сейчас! Это рекомендация Управления здравоохранения штата Нью-Йорк, Центров по контролю и профилактике заболеваний, Коллегии акушеров и гинекологов Америки (American College of Obstetricians and Gynecologists) и Медицинского общества матери и плода (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM).



Что еще необходимо знать?

- Вам не нужно проходить тест на беременность перед вакцинацией от COVID-19.
- После вакцинации вы можете продолжать кормить грудью. Вакцина не причинит вреда вашему ребенку. Вы можете снизить вероятность заражения вашего ребенка вирусом COVID-19, если пройдете вакцинацию, поскольку через утробу матери и грудное молоко ему будут передаваться защитные антитела.
- Беременные женщины могут пройти вакцинацию от COVID-19 в любом пункте вакцинации.

Зачем нужно проходить вакцинацию?

- Если вы беременны, то риск возникновения серьезных заболеваний, осложнений во время беременности и смерти от COVID-19 выше, чем у небеременных женщин.
- Вакцины от COVID-19 не вызывают инфекцию, в том числе у беременных женщин или их детей.
- У вакцинированных от COVID-19 беременных женщин не повышается риск потери беременности (выкидыша) или возникновения других проблем с беременностью.
- Вакцины от COVID-19 не оказывают никакого влияния на способность забеременеть даже среди женщин, которые проходят лечение от бесплодия.
- Согласно исследованиям, вакцины от COVID-19 не вызывают проблемы, связанные с беременностью, менструальными циклами, эректильной функцией, качеством спермы или бесплодием.

