Cascada de Tratamiento del VIH en el Estado de Nueva York, 2018

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.2% en la ciudad de Nueva York y 14.2% en el Resto del Estado)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Ciudad de Nueva York, 2018

Residentes de la Ciudad de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.2% estimación de la ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York, 2018

Residentes del Estado de Nueva York, Sin Incluir la Ciudad de Nueva York†, a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Albany del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Albany del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Binghamton del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Binghamton del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Buffalo del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Buffalo del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Lower Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Lower Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Mid Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Mid Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Rochester del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Rochester del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Syracuse del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Syracuse del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



§ Incluye casos con riesgo de transmisión del VIH por HSH (hombres que tienen sexo con otros hombres) y HSH/UDI (usuarios de drogas inyectables).

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (15.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Uso de Drogas Inyectables§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



§ Incluye casos con riesgos de transmisión del VIH por UDI y HSH/UDI.

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.5% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Heterosexuales

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.5% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Negros y Afroamericanos

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Hispanos

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (16.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Asiáticos y Nativos de las Islas del Pacífico

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (19.1% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (15.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres

Residentes del estado de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (11.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Jóvenes (personas entre 13 a 24 años de edad)

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (44% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Adultos Mayores de 50 años

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (5.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para personas mayores de 55 años de edad)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Pertenecientes a Minorías§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



§ Incluye a hombres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (15.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para varones)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Pertenecientes a Minorías§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



§ Incluye a mujeres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancas no hispanas.

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (11.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para mujeres)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health

Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre Entre Personas de Color§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2018



§ Incluye a HSH y HSH/UDI de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (15.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para HSH y HSH/UDI)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

NEW YORK STATE | Department of Health