


# Cascada de Tratamiento del VIH en el Estado de Nueva York, 2019

## Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.0% en la ciudad de Nueva York y 13.8% en el Resto del Estado)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Ciudad de Nueva York, 2019

## Residentes de la Ciudad de Nueva York† a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.0% estimación de la ciudad de Nueva York)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York, 2019

Residentes del Estado de Nueva York, Sin Incluir la Ciudad de Nueva York†, a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Albany del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Albany del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se la haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Binghamton del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Binghamton del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Buffalo del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Buffalo del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Lower Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Lower Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Mid Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Mid Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2019



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Rochester del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Rochester del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se la haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Syracuse del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Syracuse del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2019



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019

0 20,000 40,000 60,000



§ Incluye casos con riesgo de transmisión del VIH por HSH (hombres que tienen sexo con otros hombres) y HSH/UDI (usuarios de drogas inyectables).

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (15.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Uso de Drogas Inyectables§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019

0 5,000 10,000 15,000 20,000



§ Incluye casos con riesgos de transmisión del VIH por UDI y HSH/UDI.


† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.0% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Contacto Heterosexual

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.4% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como de color y/o afroamericanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.0% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como hispanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Personas estimadas que viven con el VIH (PQVCV)‡

42,900

Personas que viven con VIH diagnosticado (PQVCVD)

35,700

Cuidado del VIH durante el año\*

31,100

72% de las PQVCV  
87% de las PQVCVD

Casos con supresión viral (n.d. o <200 copias/ml) en el análisis más cercano al final del año

27,700

64% de las PQVCV  
77% de las PQVCVD  
89% de los casos con cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (16.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)


\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como blancas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019

0 10,000 20,000 30,000




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (11.3% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como multirraza

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (12.1% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como nativas americanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como asiáticas/isleñas del Pacífico

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (15.0% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Personas estimadas que viven con el VIH (PQVCV)‡

90,800

Personas que viven con VIH diagnosticado (PQVCVD)

77,400

Cuidado del VIH durante el año\*

65,800 73% de las PQVCV  
85% de las PQVCVD

Casos con supresión viral (n.d. o <200 copias/ml) en el análisis más cercano al final del año

58,600 65% de las PQVCV  
76% de las PQVCVD  
89% de los casos con cualquier cuidado del VIH

§ Sexo asignado al nacer

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Cisgenero§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000



§ Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres§

Residentes del estado de Nueva York† a Fines del 2019

0 10,000 20,000 30,000 40,000

Personas estimadas que viven con el VIH (PQVCV)‡

33,700

Personas que viven con VIH diagnosticado (PQVCVD)

30,200

Cuidado del VIH durante el año\*

26,300

78% de las PQVCV

87% de las PQVCVD

Casos con supresión viral (n.d. o <200 copias/ml) en el análisis más cercano al final del año

23,100

69% de las PQVCV

77% de las PQVCVD

88% de los casos con

cualquier cuidado del VIH

§ Sexo asignado al nacer


† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.5% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Cisgenero§

Residentes del estado de Nueva York† a Fines del 2019



§ Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.5% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



# Cascada de Tratamiento del VIH: Las personas transgénero y las personas de género no conforme o género no binario<sup>§</sup>

Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2019




<sup>§</sup> Incluye Hombre transgénero, Mujer transgénero y personas de género no conforme o género no binario

<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.0% en la ciudad de Nueva York y 13.8% en el Resto del Estado)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Jóvenes (personas entre 13 a 24 años de edad) Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (44.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Adultos Mayores de 50 años

## Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se la haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (4.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para personas mayores de 55 años de edad)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Pertenecientes a Minorías<sup>§</sup> Residentes del Estado de Nueva York<sup>†</sup> a Fines del 2019




<sup>§</sup> Incluye a hombres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

<sup>†</sup> Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

<sup>‡</sup> PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.7% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para varones)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Pertencientes a Minorías§ Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019




§ Incluye a mujeres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancas no hispanas.

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.5% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para mujeres)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

# Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre Entre Personas de Color§ Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2019



§ Incluye a HSH y HSH/UDI de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (15.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para HSH y HSH/UDI)

\* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año