


Cascada de Tratamiento del VIH en el Estado de Nueva York, 2020

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.3% estimación del Estado de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Ciudad de Nueva York, 2020

Residentes de la Ciudad de Nueva York† a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (5.5% estimación de la ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York, 2020

Residentes del Estado de Nueva York, Sin Incluir la Ciudad de Nueva York†, a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.5% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Albany del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Albany del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2020



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.5% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año



Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Binghamton del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Binghamton del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.5% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Buffalo del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Buffalo del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.5% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Lower Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Lower Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.5% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Mid Hudson del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Mid Hudson del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.5% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.5% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Rochester del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Rochester del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se la haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.5% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Syracuse del Programa Ryan White

Residentes de la Región de Syracuse del Programa Ryan White (excluye personas encarceladas) a Fines del 2020



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (8.5% estimación del Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad de Nueva York)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020

0 20,000 40,000 60,000



§ Incluye casos con riesgo de transmisión del VIH por HSH (hombres que tienen sexo con otros hombres) y HSH/UDI (usuarios de drogas inyectables).

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.6% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Uso de Drogas Inyectables§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020

0 5,000 10,000 15,000 20,000



§ Incluye casos con riesgos de transmisión del VIH por UDI y HSH/UDI.


† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (7.3% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas con Antecedentes de Contacto Heterosexual

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (12.9% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como de color y/o afroamericanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (13.4% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como hispanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (16.4% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como blancas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como multirraza

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (11.1% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como nativas americanas

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020

0 100 200 300

Personas estimadas que viven con el VIH (PQVCV)‡

250

Personas que viven con VIH diagnosticado (PQVCVD)

200

Cuidado del VIH durante el año*

170

66% de las PQVCV
83% de las PQVCVD

Casos con supresión viral (n.d. o <200 copias/ml) en el análisis más cercano al final del año

150

60% de las PQVCV
75% de las PQVCVD
91% de los casos con cualquier cuidado del VIH


† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (20.5% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Personas que se identifican como asiáticas/isleñas del Pacífico

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020



† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (12.8% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Personas estimadas que viven con el VIH (PQVCV)‡

88,800

Personas que viven con VIH diagnosticado (PQVCVD)

76,100

Cuidado del VIH durante el año*

64,700

73% de las PQVCV
85% de las PQVCVD

Casos con supresión viral (n.d. o <200 copias/ml) en el análisis más cercano al final del año

56,900

64% de las PQVCV
75% de las PQVCVD
88% de los casos con cualquier cuidado del VIH

§ Sexo asignado al nacer

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Cisgenero §

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000



§ Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.


‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres[§]

Residentes del estado de Nueva York[†] a Fines del 2020

0 10,000 20,000 30,000 40,000



[§] Sexo asignado al nacer


[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Cisgenero §

Residentes del estado de Nueva York† a Fines del 2020



§ Personas cuyo género actual es el mismo que su sexo asignado al nacer


† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Las personas transgénero y las personas de género no conforme o género no binario[§]

Residentes del Estado de Nueva York[†] a Fines del 2020




[§] Incluye Hombre transgénero, Mujer transgénero y personas de género no conforme o género no binario

[†] Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

[‡] PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (6.3%)

^{*} Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Jóvenes (personas entre 13 a 24 años de edad) Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (44.3% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Adultos Mayores de 50 años

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020




† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (4.6% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para personas mayores de 55 años de edad)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Pertenecientes a Minorías§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020




§ Incluye a hombres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para varones)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Pertenecientes a Minorías§ Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020




§ Incluye a mujeres (sexo asignado al nacer) de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancas no hispanas.

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (10.2% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para mujeres)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año

Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Contacto Sexual Hombre con Hombre Entre Personas de Color§ Residentes del Estado de Nueva York† a Fines del 2020



§ Incluye a HSH y HSH/UDI de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.

‡ PQVCVD y personas que viven con VIH no diagnosticado (14.6% estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para HSH y HSH/UDI)

* Cualquier prueba de carga viral, CD4, o prueba de secuencia de nucleótidos durante el año