

团体家庭日托机构 1 岁以下儿童调查表完成说明

- 请勿在调查表中纳入贵方日托机构的学龄前或学龄后儿童。
- 两次接种疫苗的间隔应依据免疫接种咨询委员会 (ACIP) 建议的 0 到 18 岁接种对象的免疫接种计划。

字段 1 儿童总人数 – 输入 1 岁以下儿童的总数，包括婴儿。

字段 2 没有免疫接种记录的儿童 – 输入没有免疫接种记录或其他免疫证明文件的儿童人数。请勿在字段 5 至 11 中计入没有免疫接种记录的儿童。请勿在此字段中计入有医疗或宗教豁免的儿童。

字段 3 医疗豁免 – 输入具有获得纽约州行医执照的医生提供的医疗豁免的儿童的人数。

字段 4 宗教豁免 – 输入具有因日托所认可的宗教信仰而被父母或监护人签署书面声明免除其免疫接种的儿童的人数。

* 字段 5 白喉、破伤风、百日咳 (DTaP) – 输入已按照年龄接种适量剂量 DTaP 疫苗的儿童的人数。按时开始接种此系列疫苗的儿童应在 2 个月、4 个月、6 个月龄时接种。对于接种较晚或开始接种晚的儿童，请参阅调查包中 *开始接种晚或晚于接种日 1 个月以上的 4 个月到 18 岁接种对象的补种计划*。

* 字段 6 脊髓灰质炎 – 输入已按照年龄接种适当剂量脊髓灰质炎疫苗 (IPV 或 OPV) 或血清学检查证据证明对全部 3 种脊髓灰质炎疾病血清型免疫的儿童的人数。按时开始接种此系列疫苗的儿童应在 2 个月、4 个月及 6 到 18 个月龄时接种。对于接种较晚或开始接种晚的儿童，请参阅调查包中 *开始接种晚或晚于接种日 1 个月以上的 4 个月到 18 岁接种对象的补种计划*。

* 字段 7 B 型流感嗜血杆菌 (Hib) – 输入已按照年龄接种适当剂量 Hib 疫苗的儿童的人数。按时开始接种此系列疫苗的儿童应在 2 个月、4 个月、6 个月龄时接种。对于接种较晚或开始接种晚的儿童，请参阅调查包中 *开始接种晚或晚于接种日 1 个月以上的 4 个月到 18 岁接种对象的补种计划*。

* 字段 8 乙肝疫苗 – 输入已按照年龄接种适当剂量乙型肝炎疫苗或血清学检查证据证明对乙型肝炎疾病免疫的儿童的人数。按时开始接种此系列疫苗的儿童应在出生时、1 至 2 个月、6 至 18 个月龄时接种。对于接种较晚或开始接种晚的儿童，请参阅调查包中 *开始接种晚或晚于接种日 1 个月以上的 4 个月到 18 岁接种对象的补种计划*。

团体家庭日托机构 1 岁以下儿童调查表完成说明 (续)

字段 9 **肺炎球菌** – 输入已按照其年龄接受适当剂量的肺炎球菌疫苗的儿童的人数。 请参阅调查包中的 PCV 疫苗图表。

字段 10 **已完成全部免疫接种** – 输入符合字段 5-9 所有要求的儿童数量。 计入字段 2 中的数量不应计入字段 10。 字段 10 中的数量不能大于字段 5-9 中的任何数量。

字段 11 **正在接种中** – 输入未按年龄适当接种疫苗和对每种必需疫苗系列至少接种了第一剂的儿童，以及根据 ACIP 补种计划按年龄进行了适当的预约以完成系列接种的儿童的人数。

* **联合疫苗** – 若儿童接种了含一种以上抗原成分的疫苗（如 MMR 【麻疹、腮腺炎和风疹】、MMRV 【麻疹、腮腺炎、风疹和水痘】、DTaP/Hib 【白喉、破伤风、百日咳和 B 型流感嗜血杆菌】、Dtap/IPV/Hib 【白喉、破伤风、百日咳、脊髓灰质炎、B 型流感嗜血杆菌】和 Hepatitis B /DTaP/IPV 【乙型肝炎、白喉、破伤风、百日咳和脊髓灰质炎】），则在麻疹、腮腺炎、风疹、水痘、DTaP、Hib、脊髓灰质炎和乙型肝炎的各个单独列中均应被计入已进行免疫接种。