

العام الدراسي 2021-2022

متطلبات ولاية نيويورك فيما يتعلق

بالتطعيم لدخول المدرسة/الحضور¹

ملاحظات:

ينبغي أن يكون الأطفال المنتمون لمرحلة ما قبل روضة الأطفال قد تلقوا التطعيمات المناسبة لأعمارهم. يعتمد عدد الجرعات على الجدول الموصى به من قبل اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم (Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP)). ينبغي أن تكون الفترات الفاصلة بين جرعات اللقاح مطابقة لجدول التطعيم الموصى به من قبل اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم (ACIP) للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عامًا. الجرعات التي يتم تلقيها قبل الحد الأدنى للعمر أو قبل الفترات الفاصلة المفروضة لا يُعتد بها ولا تُحسب من ضمن مجموعة الجرعات المدرجة أدناه. انظر التذييلات للمعلومات الخاصة عن كل لقاح. ينبغي أن يستوفي الأطفال الملتحقون بفصول ليست تابعة لصفوف دراسية متطلبات التطعيم للصفوف الدراسية الموازية لأعمارهم.

يجب قراءة متطلبات الجرعات مع التذييلات الخاصة بهذا الجدول

اللقاحات	مرحلة ما قبل روضة الأطفال (الرعاية النهارية أو برنامج أو Head Start أو الحضانة أو صف ما قبل روضة الأطفال)	رياض الأطفال والصفوف الأولى، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس	الصفوف الدراسية 6، 7، 8، 9، 10 و11	الصف 12
اللقاح الذي يحتوي على ذوفان الخناق والكزاز ولقاح السعال الديكي (DTaP/DTP/Tdap/Td) ²	4 جرعات	5 جرعات أو 4 جرعات إن كانت الجرعة الرابعة قد أعطيت في عمر 4 أعوام أو أكبر، أو 3 جرعات فقط إذا كان عمر الطفل 7 أعوام أو أكبر وبدأت سلسلة التطعيمات في عمر عام واحد أو أكبر	3 جرعات	
اللقاح الذي يحتوي على ذوفان الكزاز والخناق ومعزز لقاح السعال الديكي (Tdap) ³	لا ينطبق	لا ينطبق	جرعة واحدة	
اللقاح ضد شلل الأطفال (IPV/OPV) ⁴	3 جرعات	4 جرعات أو 3 جرعات إذا تم تلقي الجرعة الثالثة في عمر 4 أعوام أو أكبر		
لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) ⁵	جرعة واحدة	جرعتان		
لقاح التهاب الكبد الوبائي ب ⁶	3 جرعات	3 جرعات أو جرعتان من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب للبالغين (ريكومبيفاكس) للأطفال الذين تلقوا الجرعات بفترات فاصلة تبلغ 4 أشهر على الأقل بين العام 11 والعام 15 من أعمارهم		
لقاح الجديري المائي ⁷	جرعة واحدة	جرعتان		
لقاح المكورات السحائية (MenACWY) ⁸	لا ينطبق	لا ينطبق	الصفوف الدراسية 7، 8، 9، 10 و11: جرعة واحدة	جرعتان أو جرعة واحدة إذا تم تلقي الجرعة في عمر 16 عامًا أو أكبر
اللقاح المتقارن للمستديمة النزلية من النوع ب ⁹ (Hib)	1 إلى 4 جرعات	لا ينطبق		
اللقاح المتقارن المضاد للالتهاب الرئوي ¹⁰ (PCV)	1 إلى 4 جرعات	لا ينطبق		



1. الدليل المصلي الظاهر على وجود الأجسام المضادة للحصبة أو النكاف أو الحصبة الألمانية أو التأكيد المختبري لهذه الأمراض يعد بمثابة إثبات مقبول للمناعة من هذه الأمراض. الاختبارات المصلية لشلل الأطفال هي دليل مقبول على المناعة فقط إذا تم إجراء الاختبار قبل 1 سبتمبر 2019 وكانت جميع الأنماط المصلية الثلاثة إيجابية. يعد اختبار الدم الإيجابي للأجسام المضادة السطحية لالتهاب الكبد الوبائي (ب) دليلاً مقبولاً على المناعة التهاب الكبد الوبائي (ب). يُقبل الدليل المصلي المثبت للأجسام المضادة للحماق، أو التأكيد المختبري الجديري المائي أو التشخيص من قبل الطبيب أو مساعد الطبيب أو الممرض الممارس بأن الطفل مصاب بمرض الحماق دليل على المناعة ضد الجديري المائي .

2. لقاح ذوفانات الخناق والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي (DTaP). (الحد الأدنى للعمر: 6 أسابيع)

أ. الأطفال الذين يبدؤون سلسلة اللقاح في الموعد المحدد ينبغي أن يتلقوا سلسلة من 5 جرعات للقاح DTaP في الأعمار 2 و 4 و 6 و 15 إلى 18 شهرًا، و 4 أعوام أو أكبر. يمكن تلقي الجرعة الرابعة في عمر أصغر يصل إلى 12 شهرًا، شريطة أن يكون قد مر 6 أشهر على الأقل منذ الجرعة الثالثة. لكن الجرعة الرابعة من لقاح DTaP لا تتطلب أن يتم تكرارها إذا أعطيت بعد الجرعة الثالثة من DTaP بـ 4 أشهر على الأقل. يجب تلقي الجرعة النهائية في السلسلة في يوم الميلاد للعام الرابع من العمر أو بعده وبعد الجرعة السابقة بـ 6 أشهر على الأقل.

ب. إذا أعطيت الجرعة الرابعة من لقاح DTaP في عمر 4 أعوام أو أكبر وستة أشهر على الأقل بعد الجرعة الثالثة، تكون الجرعة الخامسة (المعززة) من لقاح DTaP غير ضرورية.

ج. بالنسبة للأطفال المولودين قبل 2005/1/1، لا يتطلب الأمر سوى مناعة ضد الدفتيريا ويمكن أن تلبى جرعات DT و Td هذا المطلب.

د. ينبغي أن يتلقى الأطفال من عمر 7 سنوات فأكثر الذين لم يتلقوا تطعيم سلسلة لقاحات DTaP للأطفال بشكل كامل لقاح Tdap كجرعة أولى في السلسلة التعويضية؛ إذا كانت هناك حاجة لجرعات إضافية، فاستخدم لقاح Td أو Tdap. إذا تم تلقي الجرعة الأولى قبل عيد ميلاده الأول، فسيلازم 4 جرعات، طالما تم تلقي الجرعة النهائية في سن 4 سنوات أو أكثر. إذا تم تلقي الجرعة الأولى في عيد ميلاده الأول أو بعده، فسيلازم 3 جرعات، طالما تم تلقي الجرعة النهائية في سن 4 سنوات أو أكثر.

3. لقاح ذوفانات الكزاز والخناق والسعال الديكي غير الخلوي (Tdap) المعزز للمراهقين. (الحد الأدنى للسنة للصفين 6 و 7: 10 سنوات؛ الحد الأدنى للعمر للصفوف من 8 إلى 12: 7 أعوام)

أ. يلزم على الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا أو أكبر الذين يدخلون إلى الصفوف الدراسية 6 إلى 12 أن يتلقوا جرعة واحدة من Tdap.

ب. بالإضافة إلى متطلبات الصف السادس إلى الثاني عشر، يمكن أيضًا إعطاء لقاح Tdap كجزء من السلسلة التعويضية للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات فما فوق والذين لم يتم تحصينهم بشكل كامل بسلسلة DTaP للأطفال، كما هو موضح أعلاه في العام الدراسي -2021 2022، فقط جرعات Tdap التي تُعطى في سن 10 سنوات أو أكثر تفي بمتطلبات Tdap للطلاب في الصفين السادس والسابع؛ ومع ذلك، فإن جرعات Tdap التي يتم إعطاؤها في سن 7 سنوات أو أكثر تفي بالمتطلبات للطلاب في الصفوف من 8 إلى 12.

ج. الطلاب الذين يبلغون من العمر 10 سنوات في الصف السادس والذين لم يتلقوا لقاح Tdap بعد، يمتثلون حتى يبلغوا 11 عامًا.

4. لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) أو لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV). (الحد الأدنى للعمر: 6 أسابيع)

أ. الأطفال الذين يبدؤون سلسلة اللقاح في الموعد المحدد ينبغي أن يتلقوا سلسلة من لقاح IPV في الأعمار 2 و 4 و 6 حتى 18 شهرًا، و 4 أعوام أو أكبر. يجب تلقي الجرعة النهائية في السلسلة في يوم الميلاد للعام الرابع من العمر أو بعده وبعد الجرعة السابقة بـ 6 أشهر على الأقل.

ب. بالنسبة للطلبة الذين تلقوا جرعتهم الرابعة قبل العام الرابع من العمر، وقبل 7 أغسطس 2010، يكفيهم تلقي 4 جرعات تفصل 4 أسابيع على الأقل بين كل منها والتي تليها.

ج. إذا أعطيت الجرعة الثالثة من لقاح شلل الأطفال في عمر 4 أعوام أو أكبر وستة أشهر على الأقل بعد الجرعة السابقة، تكون الجرعة الرابعة من لقاح شلل الأطفال غير ضرورية.

د. بالنسبة للأطفال الذين لديهم سجل لقاح شلل الأطفال الفموي، يتم احتساب لقاح OPV ثلاثي التكافؤ فقط (tOPV) ضمن متطلبات لقاح شلل الأطفال في مدارس ولاية نيويورك. يجب احتساب جرعات اللقاح الفموي التي تُعطى قبل 1 أبريل 2016 ما لم يُذكر على وجه التحديد على أنها أحادية التكافؤ أو ثنائية التكافؤ أو على النحو الذي تم إعطاؤه أثناء حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال. لا ينبغي احتساب جرعات لقاح شلل الأطفال الفموي المعطى في أو بعد 1 أبريل 2016.

5. لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (Measles-mumps-rubella, MMR) (الحد الأدنى للعمر: 12 شهرًا)

أ. يجب تلقي الجرعة الأولى من لقاح MMR في يوم الميلاد للعام الأول أو بعده. يجب تلقي الجرعة الثانية بعد 28 يومًا (4 أسابيع) على الأقل من الجرعة الأولى ليُعتد بها.

ب. الحصبة: يلزم على الأطفال في مرحلة ما قبل روضة الأطفال تلقي جرعة واحدة. مطلوب جرعتان للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

ج. النكاف: يلزم على الأطفال في مرحلة ما قبل روضة الأطفال تلقي جرعة واحدة. مطلوب جرعتان للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

د. الحصبة الألمانية: مطلوب جرعة واحدة على الأقل لجميع الصفوف (ما قبل الروضة حتى الصف 12).

6. لقاح التهاب الكبد ب

أ. يمكن إعطاء الجرعة الأولى عند المولد أو في أي وقت بعد ذلك. يجب تلقي الجرعة الثانية بعد الجرعة الأولى بـ 4 أسابيع (28 يومًا) على الأقل. يجب أن تكون الجرعة الثالثة بعد الجرعة الثانية بـ 8 أسابيع على الأقل وبعد الجرعة الأولى بـ 16 أسبوعًا على الأقل وليس قبل بلوغ 24 أسبوعًا من العمر (عند إعطاء 4 جرعات، استبدل "الجرعة الرابعة" بـ "الجرعة الثالثة" في هذه الحسابات)..

ب. ستستوفي جرعتان من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب (ريكومبيفاكس)، يفصل بين تلقيهما 4 أشهر على الأقل، عند عمر يتراوح بين 11 عامًا و 15 عامًا المطلوب.

7. لقاح الجديري المائي. (الحد الأدنى للعمر: 12 شهرًا)

أ. يجب تلقي الجرعة الأولى من لقاح الجديري المائي في يوم الميلاد للعام الأول أو بعده. يجب تلقي الجرعة الثانية بعد 28 يومًا (4 أسابيع) على الأقل من الجرعة الأولى ليُعتد بها.

ب. بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، فإن الحد الأدنى الموصى به للفواصل الزمنية بين الجرعات هو 3 أشهر (إذا تم إعطاء الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع على الأقل من الجرعة الأولى، يمكن قبولها على أنهاصالحة)؛ بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق، فإن الحد الأدنى للفواصل الزمنية بين الجرعات هو 4 أسابيع.

8. لقاح المكورات السحائية (MenACWY). (الحد الأدنى للعمر للصفوف من 7 إلى 8: 10 سنوات؛ الحد الأدنى للعمر للصفوف من 9 إلى 12: 6 أسابيع).

أ. مطلوب جرعة واحدة من لقاح المكورات السحائية المتقارن (Menactra أو Menveo أو MenQuadfi) للطلاب الذين يدخلون الصفوف 7 و 8 و 9 و 10 و 11.

ب. بالنسبة للطلاب في الصف الثاني عشر، إذا تم تلقي الجرعة الأولى من لقاح المكورات السحائية المتقارن في سن 16 عامًا أو أكثر، فلن تكون الجرعة الثانية (المعززة) مطلوبة.

ج. يجب أن تكون الجرعة الثانية قد تم تلقيها في سن 16 عامًا أو أكثر. الحد الأدنى للفواصل الزمنية بين الجرعات هو 8 أسابيع.

9. اللقاح المتقارن للمستديمة النزلية من النوع ب (Hib). (الحد الأدنى للعمر: 6 أسابيع)

أ. ينبغي على الأطفال الذين يبدؤون السلسلة في الموعد المحدد تلقي لقاح Hib عند عمر شهرين و 4 أشهر و 6 أشهر و 12 شهرًا حتى 15 شهرًا من العمر. يجب إعطاء الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 شهرًا جرعات لقاح تعويضية وفقًا لجدول ACIP للسلسلة التعويضية. يجب تلقي الجرعة النهائية في عمر 12 شهرًا أو بعده.

ب. إذا تم تلقي جرعتين من اللقاح قبل بلوغ 12 شهرًا من العمر، يتطلب الأمر الثالثة جرعات فقط؛ وتكون الجرعة الثالثة عند عمر 12 شهرًا إلى 15 شهرًا وبعد الجرعة الثانية بـ 8 أسابيع على الأقل.

ج. إذا تم تلقي الجرعة الأولى عند عمر يتراوح بين 12 شهرًا و 14 شهرًا، يتطلب الأمر جرعتين فقط، وتكون الجرعة الثانية بعد الجرعة الأولى بـ 8 أسابيع على الأقل.

د. إذا تم تلقي الجرعة الأولى عند عمر 15 شهرًا من العمر أو أكبر، يتطلب الأمر جرعة واحدة فقط.

هـ. لا يلزم لقاح Hib للأطفال في عمر 5 أعوام أو أكبر.

10. اللقاح المتقارن المضاد للالتهاب الرئوي (PCV). (الحد الأدنى للعمر: 6 أسابيع)

أ. ينبغي على الأطفال الذين يبدؤون السلسلة في الموعد المحدد تلقي لقاح PCV عند عمر شهرين و 4 أشهر و 6 أشهر و 12 شهرًا حتى 15 شهرًا من العمر. يجب إعطاء الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 شهرًا جرعات لقاح تعويضية وفقًا لجدول ACIP للسلسلة التعويضية. يجب تلقي الجرعة النهائية في عمر 12 شهرًا أو بعده.

ب. الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح وتبلغ أعمارهم 7 إلى 11 شهرًا من العمر يلزمهم تلقي جرعتين، يفصل بينهما 4 أسابيع على الأقل، وتتبعهما جرعة ثالثة عند عمر 12 إلى 15 شهرًا.

ج. الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح وتبلغ أعمارهم 12 إلى 23 شهرًا يلزمهم تلقي جرعتين من اللقاح يفصل بينهما 8 أسابيع على الأقل.

د. إذا تم تلقي جرعة واحدة عند عمر 24 شهرًا من العمر أو أكبر، فلا يتطلب الأمر جرعات إضافية.

هـ. لا يلزم لقاح PCV للأطفال في عمر 5 أعوام أو أكبر.

و. للمزيد من المعلومات، ارجع إلى رسم PCV التوضيحي في كتيب تعليمات استبيان المدرسة على الرابط: www.health.ny.gov/prevention/immunization/schools

للمزيد من المعلومات، تواصل مع:

إدارة الصحة بولاية نيويورك (New York State Department of Health)
Bureau of Immunization (مكتب التطعيم)
Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY 12237
(518) 473-4437

New York City Department of Health and Mental Hygiene (إدارة الصحة والصحة العقلية بمدينة نيويورك)
Program Support Unit (وحدة دعم البرامج)، Bureau of Immunization (مكتب التطعيم)
42-09 28th Street, 5th floor
Long Island City, NY 11101
(347) 396-2433

New York State Department of Health/Bureau of Immunization
health.ny.gov/immunization