

더 자세한 정보 및 지원.

New York State Department of Health
health.ny.gov/diseases/aids/publications

New York State HIV/AIDS 핫라인(무료 전화)

영어: 1-800-541-AIDS

스페인어: 1-800-233-SIDA

TDD: 1-800-369-2437

보이스 발신자는 뉴욕 중계 시스템
(New York Relay System)인 711번 또는
1-800-421-1220번으로 연락하셔서
교환원에게 요청하여 1-800-541-2437
번으로 전화를 걸어 주십시오.

NYSDOH Anonymous HIV Counseling and Testing Program(NYSDOH 익명 HIV 상담 및 검사 프로그램)

HIV 정보, 의뢰 또는 무료, 익명의 HIV 검사를
받는 방법에 대한 정보는 익명 HIV 상담 및
검사 프로그램에 문의하십시오.

Albany 지역: 1-800-962-5065

Buffalo 지역: 1-800-962-5064

Long Island 지역(Suffolk/Nassau):
1-800-462-6786

Lower Hudson Valley 지역:
1-800-828-0064

Rochester 지역: 1-800-962-5063; TDD:
1-585-423-8120

Syracuse 지역: 1-800-562-9423

**New York City: DOHMH STD 클리닉에
관한 정보는 311번**

더 자세한 정보 및 지원.

New York City HIV/AIDS Hotline(뉴욕시
HIV/AIDS 핫라인)

1-800-TALK-HIV (825-5448)

National Centers for Disease Control(국립
질병 통제 센터) STD hotlines(성병
핫라인)

영어/스페인어 1-800-232-4636, TTY
1-888-232-6348

New York State HIV/AIDS Counseling
Hotline(뉴욕주 HIV/AIDS 상담 핫라인):
1-800-872-2777

New York State HIV/AIDS Partner
Services(뉴욕주 HIV/AIDS 파트너
서비스):
1-800-541-AIDS

New York City Contact Notification
Assistance Program(뉴욕시 연락처 알림
지원 프로그램):
1-212-693-1419

기밀 유지

New York State HIV Confidentiality
Hotline(뉴욕주 HIV 기밀 유지 핫라인):
1-800-962-5065

Legal Action Center(법무센터): 1-212-243-1313
또는 1-800-223-4044



9861 (Korean)

Department
of Health

검사 하십시오

이 의료 시설은 13세 이상의 모든
환자에게 HIV 검사를 제공하여
양질의 의료 행위 및 공공 보건
법을 준수합니다.

정기 검진 항목

✓	혈당
✓	콜레스테롤
✓	HIV 검사
✓	총 혈구수
✓	지질(Lipid) 검사

최악의 HIV 상태: 상태 모름
검사를 통해 통제할 수
있습니다.

hivtestny.org, Health.ny.gov/aids, NYC.gov/health

HIV 검사를 받기 전에 알아야 할 핵심 요소.

- HIV 검사는 자발적이며 모든 HIV 검사 결과는 기밀(비공개)입니다.
- HIV는 피임기구 없는 성관계, 주사기 공유, 출산 또는 모유 수유로 전염될 수 있습니다.
- HIV 치료는 효과적이며, 부작용이 거의 없거나 전혀 없으며 하루에 약을 한 알 정도 복용해야 할 수 있습니다.
- 자신의 HIV 상태를 알고 HIV 치료를 받거나 HIV 사전 노출 예방(Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP)을 취함으로써 파트너끼리 서로를 안전하게 지킬 수 있습니다. 주사기를 공유하지 않고 보다 안전한 성관계를 하면 HIV, C형 간염 및 기타 STD 예방에 도움이 됩니다.
- HIV 상태를 이유로 차별하는 것은 불법입니다.
- 익명 HIV 검사(이름을 밝히지 않음)는 특정 공공 검사 시설에서 이용할 수 있습니다.
- HIV 검사는 의료 서비스의 정기 검진 항목이지만 본인의 HIV 검사를 반대하거나 거부할 수 있는 권리가 있습니다.
- HIV 검사를 거부하려면, 의료 서비스 제공자에게 알리십시오.

HIV 검사는 임산부에게 특히 중요합니다.

- HIV에 감염된 여성은 임신, 출산 중 또는 모유 수유를 통해 바이러스를 아기에게 전염시킬 수 있습니다.
- 임신 전 또는 임신 초기에 HIV 상태를 아는 것이 훨씬 중요하며 본인의 건강과 아기의 건강에 관한 중요한 결정을 내릴 수 있습니다.
- HIV 검사는 임신 초기 가능한 빠른 시기에 시행되며 환자 동의하에 임신 28주경에 다시 시행됩니다.
- 임신 중이며 HIV에 감염된 경우, 본인의 건강을 위한 치료가 가능하며 아기에게 HIV가 전염되는 것을 방지할 수 있습니다.
- HIV에 감염되었으나 치료를 받지 않는 경우, HIV를 아기에게 전염시킬 확률은 4분의 1입니다. 치료를 받으면 아기에게 HIV를 전염시킬 확률이 훨씬 낮습니다.
- 임신 중에 검사를 받지 않은 경우, 진료 제공자는 분만 시 검사를 권장할 것입니다. 모든 경우에, 아기는 출생 후 검사를 받게 됩니다. 아기의 검사 결과가 양성이라면, 산모는 HIV에 감염되었고 아기가 바이러스에 전염되었다는 것을 의미합니다.

HIV 검사 결과를 언제, 어떻게 알게 되는지 진료 제공자와 상담하십시오.

주 법률은 HIV 검사 결과의 기밀(프라이버시)을 보호합니다. 또한 HIV 감염 상태에 따른 차별을 방지합니다.