

Profilaxis de emergencia
posterior a la exposición
brindada en farmacias para
la prevención del VIH

PEP PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH

Si usted necesita la PEP y no cuenta con cobertura médica (Medicaid o seguro privado) diríjase directamente a un Departamento de Emergencia.

Si se encuentra en la ciudad de Nueva York, hay otras opciones disponibles para el acceso a la PEP de bajo costo. Visite el mapa de salud de la ciudad de Nueva York: <https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHHealthMap>.

Para encontrar los sitios donde se ofrecen estos servicios, seleccione del menú de servicios que se encuentra a la izquierda:

- Servicios de salud sexual
- PrEP y PEP
- Escala variable para personas sin seguro
- PEP gratuita para personas sin seguro

LOS 4 PUNTOS DE PEP PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH

1.

Si tuvo relaciones sexuales o compartió una aguja con una persona con VIH, o que desconoce su condición en relación con el VIH,

2.

y si la exposición ocurrió dentro de las últimas 72 horas,

3.

un farmacéutico cualificado en la farmacia

4.

puede ayudarlo para que usted comience a tomar el medicamento contra el VIH.

Dado que la PEP se debe comenzar cuanto antes, una farmacia es un buen lugar para visitar por las siguientes razones:

- Las farmacias suelen estar cerca y abren durante horarios extendidos.
- Las farmacias cuentan con los medicamentos para la PEP.
- Los farmacéuticos son personas cualificadas y serviciales que pueden ayudarlo de manera confidencial.
- Si le preocupa la confidencialidad, puede solicitar hablar con el farmacéutico en privado.

La PEP puede prevenir el VIH cuando los medicamentos se administran lo antes posible y se toman todos los días durante 28 días.

- El farmacéutico puede ayudarlo para que usted comience a tomar el medicamento y le proporcionará las dosis suficientes para tomar durante 7 días.
- El farmacéutico le explicará la importancia de consultar con un proveedor de atención médica.
- Puede visitar a su proveedor de atención médica de cabecera, si tiene uno, o el farmacéutico puede programar una consulta con un proveedor de atención médica para usted.

Si decide comenzar con la PEP en la farmacia, el farmacéutico colaborará con usted para programar una consulta con un proveedor de atención médica lo antes posible, dentro de 1 a 3 días.

El proveedor de atención médica realizará lo siguiente:

1. Evaluará la exposición al VIH.
2. Le ofrecerá pruebas de VIH.
3. Decidirá si le otorgará una receta para continuar con los medicamentos durante los 28 días de PEP contra el VIH.
4. Evaluará una posible exposición a la hepatitis B y C, y tomará las medidas necesarias.
5. Le aconsejará tomar los medicamentos según lo recetado.

Aprenda sobre la profilaxis previa a la exposición (PrEP).

Si ha usado la PEP con éxito en una exposición anterior y desea protegerse del VIH en el futuro, puede considerar recurrir a la profilaxis previa a la exposición (PrEP). Si las pruebas de VIH arrojan resultados negativos, entonces la PrEP es una opción preventiva para usted.

Hable con su proveedor de atención médica sobre la PrEP o también puede hacer lo siguiente:

- Visitar una Sexual Health Clinic (Clínica de Salud Sexual) de la ciudad de Nueva York (solo para residentes de la ciudad de Nueva York): <https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCSiteLocator>
- Consultar el directorio de proveedores de PrEP del estado de Nueva York para obtener información sobre los proveedores en la ciudad de Nueva York y en todo el estado:

www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/